

## Foreløbige beregningsregler for axial spondyl artrit (AxSpA)

### Kvalitetsindikatorer – gældende fra 01.01.2020

Indikator	Beskrivelse	Nævner	Tæller	Uoplyst	Ekskluderet	Standard	Kommentarer
1. Ny-diagnosticerede AxSpA patienter skal følges med tæt kontrol	Ny-diagnosticerede AxSpA patienter skal registreres med sygdomsaktivitet (BASDAI og/eller ASDAS) og funktionsniveau (BASFI) mindst 3 gange samt angivelse af medicinsk behandling det første sygdomsår. Ved oprettelse (baseline) i DANBIO registreres diagnostetidspunkt og diagnose.	Alle ny-diagnosticerede AxSpA patienter i året før årsrapportens periode, der er i live ved udgangen af årsrapportperioden. Patienten skal minimum være 16 år på diagnose-tidspunktet.	Patienter i nævner, som har mindst 3 fulde registreringer af BASDAI og/eller ASDAS, BASFI samt angivelse af medicinsk behandling fra diagnosepunkt + 13 mdr. frem.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der skifter afdeling / praksis i det første sygdoms år</li> <li>• Patienter bosat i Grønland.</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 13 mdr. efter diagnosedato</li> <li>• Patienter, der har haft en sygdoms-varighed på &gt; 1 år før årsrapport-perioden</li> </ul>	Min 90%	
2. Ny-diagnosticerede AxSpA patienter skal være undersøgt for CRP og HLA-B27 på diagnostetidspunktet	Ny-diagnosticerede axSpA patienter skal registreres med CRP og HLA-B27 på diagnostetidspunktet (+/- 6 mdr.).	Alle ny-diagnosticerede AxSpA patienter i året før årsrapportens periode, der er i live ved udgangen af årsrapportperioden. Patienten skal minimum være 16 år på diagnose-tidspunktet.	Patienter i nævner der har fået målt og registreret CRP +/- 6 mdr. og HLA-B27 + 1 år. ift. diagnostetidspunktet (HLA-B27 - et hvilket som helst tidspunkt før diagnose til kalenderåret efter diagnoseåret)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der skifter afdeling / praksis i det første sygdoms år</li> <li>• Patienter bosat i Grønland.</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 13</li> </ul>	Min 90%	

					mdr. efter diagnosedato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter, der har haft en sygdomsvarighed på &gt; 1 år før årsrapportperioden</li> </ul>		
3. Ny-diagnosticerede AxSpA patienter skal være undersøgt med bevægelighed på diagnosetidspunktet	Ny-diagnosticerede skal registreres med bevægelighed (BASMI) på diagnosetidspunktet (+/- 6 mdr.).	Alle ny-diagnosticerede AxSpA patienter i året før årsrapportens periode, der er i live ved udgangen af årsrapportperioden. Patienten skal minimum være 16 år på diagnosetidspunktet.	Patienter i nævner, der har fået målt og registreret BASMI på diagnosetidspunkt +/- 6 mdr.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der skifter afdeling / praksis i det første sygdomsår</li> <li>• Patienter bosat i Grønland.</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 13 mdr. efter diagnosedato</li> <li>• Patienter, der har haft en sygdomsvarighed på &gt; 1 år før årsrapportperioden</li> </ul>	Min 90%	
4. Ny-diagnosticerede AxSpA patienter skal have udført MR-skanning og/eller røntgen status på diagnosetidspunktet	Ny-diagnosticerede AxSpA patienter skal have udført MR-skanning og/eller røntgen status (SI-led og columna lumbalis) på diagnosetidspunktet (+/- 6 mdr.).	Alle ny-diagnosticerede AxSpA patienter i året før årsrapportens periode, der er i live ved udgangen af årsrapportperioden. Patienten skal minimum være 16 år på diagnosetidspunktet.	Patienter i nævner, der har registreret dato for MR-skanning og/eller røntgen undersøgelse (SI-led og columna lumbalis) på diagnosetidspunkt +/- 6 mdr.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der skifter afdeling / praksis i det første sygdomsår</li> <li>• Patienter bosat i Grønland.</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 13</li> </ul>	Min 95%	

					mdr. efter diagnosedato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter, der har haft en sygdomsvarighed på &gt; 1 år før årsrapportperioden</li> </ul>		
5. Ny-diagnosticerede AxSpA patienter ≥ 30 år på diagnosetidspunktet skal have udført DXA scanning på diagnosetidspunktet	Ny-diagnosticerede AxSpA patienter ≥ 30 år på diagnosetidspunktet skal have udført DXA scanning på diagnosetidspunktet (+/- 12 mdr.).	Alle ny-diagnosticerede AxSpA patienter i året før årsrapportens periode, ≥ 30 år v diagnose, der er i live ved udgangen af årsrapportperioden	Patienter i nævner, der har registreret dato for DXA scanning på diagnosetidspunkt +/- 12 mdr.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der skifter afdeling / praksis i det første sygdomsår</li> <li>• Patienter bosat i Grønland.</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 13 mdr. efter diagnosedato</li> <li>• Patienter, der har haft en sygdomsvarighed på &gt; 1 år før årsrapportperioden</li> </ul>	Ikke fastsat	Pauseret
6. Patienter med AxSpA skal følges longitudinelt med sygdomsaktivitet, funktionsniveau og angivelse af medicinsk behandling	Patienter med AxSpa med sygdomsvarighed > 1 år skal registreres mindst én gang årligt med et fuldt visit* mellem 12 og 24 mdr. efter diagnosedato (24 og 36 mdr., 36 og 48 mdr. osv. alt afhængigt af hvor mange år man har haft sin diagnose).	AxSpA patienter i DANBIO, i live ved udgangen af årsrapportperioden, med sygdomsvarighed over 1 år	Patienter i nævneren, der har mindst ét årligt fuldt registreret visit* mellem 12 og 24 mdr. efter diagnosedato (24 og 36 mdr., 36 og 48 mdr. osv. alt afhængigt af hvor mange år man har haft sin diagnose). * BASDAI og/eller ASDAS og BASFI, samt angivelse af medicinsk behandling		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter med sygdomsvarighed i ≤ 1 år.</li> <li>• Patienter der skifter afdeling / praksis</li> <li>• Patienter bosat i Grønland.</li> </ul>	Min 90%	Ændret til kun et visit i 2020

	* Med sygdomsaktivitet (BASDAI og/eller ASDAS), funktionsniveau (BASFI) og angivelse af medicinsk behandling.		(ved flere fulde standard visits i opfølgingsperioden, bruges det sidste komplette)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter, der har fået tildelt et cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live på afrapportering stidspunktet (12, 24, 36, 48 osv. mdr. efter diagnosedato)</li> </ul>		