


## Kvalitetsindikatorer for patienter med leddegigt

Nr.	Navn	Standard
	Nydiagnosticerede leddegigt patienter skal følges med tæt kontrol.	<p>Nydiagnosticerede leddegigt patienter skal registreres med <i>sygdomsaktivitet</i> (DAS28 og/eller CDAI), <i>funktionsniveau</i> (HAQ) og <i>smerte</i> (VAS-smerte) mindst 3 gange (3 fulde visits) samt angivelse af <i>medicinsk behandling</i> det første sygdomsår. Ved oprettelse i DANBIO registreres <i>diagnosetidspunkt</i> og <i>diagnose</i>.</p> <p><b>Kvalitetsmål:</b> Mindst 80% af nydiagnosticerede leddegigt patienter skal opfylde standarden.</p>
1	<p><b>Beregningsmetode</b></p> <p><u>Tæller:</u> Nydiagnosticerede leddegigt patienter i det aktuelle år med et års followup efter diagnosetidspunktet, som har mindst 3 fulde registreringer af <i>DAS28</i> og/eller <i>CDAI</i>, <i>HAQ</i>, <i>VAS smerte</i> samt angivelse af <i>medicinsk behandling</i>. Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.</p> <p><u>Nævner:</u> Nydiagnosticerede leddegigt patienter i det aktuelle år med et års followup efter diagnosetidspunktet. Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.</p> <p><u>Uoplyst:</u> Ikke mulig.</p>	 <p><i>Figur 1</i></p>

Nydiagnosticerede leddegigt patienter skal være undersøgt for anti-CCP og IgM reumafaktor på diagnosetidspunktet

Nydiagnosticerede leddegigt patienter skal registreres med anti-CCP og IgM reumafaktor (eksakt- eller dikotomt svar) på diagnosetidspunktet (+/- 6 mdr.).

**Kvalitetsmål:** Mindst 90% af nydiagnosticerede leddegigt patienter skal opfylde standarden.


**Beregningsmetode**

Tæller: Nydiagnosticerede leddegigt patienter i det aktuelle år, der har fået målt og registreret anti-CCP og IgM reumafaktor på diagnosetidspunktet (+/- 6 mdr.). Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.


Nævner: Nydiagnosticerede leddegigt patienter i det aktuelle år. Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.


Uoplyst: Ikke mulig.


2




Figur 2

<p>Nydiagnosticerede leddegigt patienter skal have udført røntgen status på diagnosetidspunktet.</p>	<p>Nydiagnosticerede leddegigt patienter skal have udført <i>røntgen status</i> (hænder, håndled og forfødder) på diagnosetidspunktet (+/- 6 mdr.).</p> <p><b>Kvalitetsmål:</b> Mindst 90% af nydiagnosticerede leddegigt patienter skal opfylde standarden.</p>
<p><b>Beregningsmetode</b></p> <p><u>Tæller:</u> Nydiagnosticerede leddegigt patienter i det aktuelle år, som har fået udført og registreret <i>røntgen status</i> (hænder, håndled og forfødder) på diagnosetidspunktet (+/- 6 mdr.). Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.</p> <p><u>Nævner:</u> Nydiagnosticerede leddegigt patienter i det aktuelle år. Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.</p> <p><u>Uoplyst:</u> Ikke mulig.</p> <div style="text-align: center;"> <p>3</p>  <p>The diagram shows a horizontal timeline with an arrow pointing right. It marks several points: '1. jan' at the start, '1. jan' at the beginning of the 'Aktuelle år' (indicated by a red bracket), '1. jan' at the end of the 'Aktuelle år' (indicated by a red bracket), '1. jan' at the end of the '+/- 6 mdr.' window (indicated by a blue bracket), and '1. jan' at the end of the 'Årsrapport udgivelse' period. The 'Aktuelle år' and '+/- 6 mdr.' periods overlap.</p> </div> <p><i>Figur 3</i></p>	

<p>Nydiagnosticerede leddegigt patienter &gt; 40 år på diagnosetidspunktet skal have udført DXA scanning på diagnosetidspunktet.</p>	<p>Nydiagnosticerede leddegigt patienter &gt; 40 år på diagnosetidspunktet skal have udført DXA scanning på diagnosetidspunktet (+/- 12 mdr.).</p> <p><b>Kvalitetsmål:</b> Mindst 80% af nydiagnosticerede leddegigt patienter &gt; 40 år skal opfylde standarden.</p>
<p><b>Beregningsmetode</b></p> <p><u>Tæller:</u> Nydiagnosticerede leddegigt patienter &gt; 40 år på diagnosetidspunktet i det aktuelle år, der har fået udført DXA scanning på diagnosetidspunktet (+/- 12 mdr.). Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.</p> <p><u>Nævner:</u> Nydiagnosticerede leddegigt patienter &gt; 40 år på diagnosetidspunktet i det aktuelle år. Patienter der skifter afdeling/praksis i løbet af det første sygdomsår indgår ikke.</p> <p><u>Uoplyst:</u> Ingen.</p> <p>4</p>  <p><i>Figur 4</i></p>	

5	<p>Leddegigt patienter skal følges longitudinelt.</p>	<p>Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; 1 år fra diagnosetidspunktet skal registreres mindst 1 gang årligt (ét fuldt visit) med <i>sygdomsaktivitet</i> (DAS28), <i>funktionsniveau</i> (HAQ), <i>smertes</i> (VAS-smerte) og angivelse af <i>medicinsk behandling</i>.</p> <p><b>Kvalitetsmål:</b> Mindst 90% af leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; 1 år fra diagnosetidspunktet skal opfylde standarden.</p>
	<p><b>Beregningsmetode</b></p> <p><u>Tæller:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; 1 år fra diagnosetidspunktet, der indenfor 365 dage før det sidste visit i det aktuelle år har mindst én registrering (ét fuldt visit) af <i>DAS28</i>, <i>HAQ</i>, <i>VAS smerte</i> og angivelse af <i>medicinsk behandling</i>. Patienter der skifter afdeling/praksis indgår ikke.</p> <p><u>Nævner:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; 1 år fra diagnosetidspunktet.</p> <p><u>Uoplyst:</u> Ikke muligt.</p> 	

Figur 5

<b>6a</b>	Leddegigt patienter skal have velbehandlet sygdom.	Leddegigt patienter med sygdomsvarighed > ½ år fra diagnosetidspunktet skal have lav sygdomsaktivitet (DAS28 < 3,2 <u>og</u> ingen hævede led).  <b>Kvalitetsmål:</b> Mindst 70% af leddegigt patienter med sygdomsvarighed > ½ år fra diagnosetidspunktet skal opfylde standarden.
	<p><b>Beregningsmetode</b></p> <p><u>Tæller:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; ½ år fra diagnosetidspunktet, hvor der ved seneste standardvisit i aktuelle år findes DAS28 &lt; 3,2 <u>og</u> ingen hævede led.</p> <p><u>Nævner:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; ½ år fra diagnosetidspunktet.</p> <p><u>Uoplyst:</u> Ingen DAS28 registrering i det aktuelle år.</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Aktuelle år</p> <p>1. jan                      visit                      1. jan                      Årsrapport udgivelse</p> </div> <p><i>Figur 6</i></p>	

	<p>Ved moderat/høj sygdomsaktivitet skal der taget stilling til en behandlingsstrategi.</p>	<p>Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; ½ år fra diagnosetidspunktet, hvor der findes DAS28 &gt; 3,2 <u>og</u> mindst et hævet led ved seneste standardvisit i aktuelle år, skal den behandelende læge tage stilling til en af følgende behandlingsstrategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Behandling intensiveret</i></li> <li>- <i>Behandlingsændring aktuelt ikke mulig/afventer behandlingsresultat</i></li> <li>- <i>Behandlingsmuligheder udtømt</i></li> <li>- <i>Pt ønsker ikke behandlingen ændret</i></li> <li>- <i>Andet</i></li> </ul> <p><b>Kvalitetsmål:</b> Mindst 90% af leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; ½ år fra diagnosetidspunktet med DAS28 &gt; 3,2 <u>og</u> mindst et hævet led skal opfylde standarden.</p>
<p><b>6b</b></p>	<p><b>Beregningsmetode</b></p> <p><u>Tæller:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; ½ år fra diagnosetidspunktet, der ved seneste standardvisit i aktuelle år findes DAS28 &gt; 3,2 <u>og</u> mindst et hævet led, hvor der er taget stilling til én af fem behandlingsstrategier.</p> <p><u>Nævner:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed &gt; ½ år fra diagnosetidspunktet, der ved seneste standardvisit i aktuelle år findes DAS28 &gt; 3,2 <u>og</u> mindst et hævet led</p> <p><u>Uoplyst:</u> Ingen DAS28 registrering i det aktuelle år.</p> <p>Se figur 6.</p>	

7	<p>Leddegigt patienters funktionsniveau må ikke forringes væsentlig.</p>	<p>Leddegigt patienter med sygdomsvarighed <math>&gt; \frac{1}{2}</math> år fra diagnosetidspunktet skal ved seneste standardvisit i aktuelle år have HAQ-score <math>\leq</math> HAQ-score ved første DANBIO visit.</p> <p><b>Kvalitetsmål:</b> Mindst 80% af leddegigt patienter med sygdomsvarighed <math>&gt; \frac{1}{2}</math> år skal opfylde standarden.</p>
	<p><b>Beregningsmetode</b></p> <p><u>Tæller:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed <math>&gt; \frac{1}{2}</math> år fra diagnosetidspunktet, der ved seneste standardvisit i aktuelle år har HAQ-score <math>\leq</math> HAQ-score ved første DANBIO visit.</p> <p><u>Nævner:</u> Leddegigt patienter med sygdomsvarighed <math>&gt; \frac{1}{2}</math> år fra diagnosetidspunktet.</p> <p><u>Uoplyst:</u> Ingen HAQ registrering i det aktuelle år.</p> <p>Se figur 6.</p>	