



DANBIO
Dansk Reumatologisk
Database

MabThera (rituximab) – hvordan registreres det i DANBIO?

MabThera gives typisk som to infusioner a 1000 mg i.v. med 14 dages mellemrum. Den kliniske effekt ses først efter uger til måneder.

Hvis vi som reumatologer skal kunne dokumentere effekten af behandlingen er det afgørende, at patienterne registreres ved hvert efterfølgende besøg i minimum et år efter infusionerne. Konkret foregår registreringen således:

1. Patienten oprettes i DANBIO (hvis det ikke allerede er sket)
2. Opret nyt behandlingsforløb og vælg rituximab. Vælg dosis: f.eks. 1000 mg, og hyppighed: f.eks. 2 gange med 14 dages mellemrum. Indtast startdato (dato for første infusion).
3. Opret nyt besøg ved hvert fremmøde. I kommentarfeltet skrives, hvilken anden medicin, der gives samtidigt med infusionerne, f.eks. methylprednisolon 1000 mg i.v. og paracetamol 1 g p.o.
4. Husk at ændre rituximab-dosis til 0 mg, ved de efterfølgende besøg!
5. Hvis patienten senere får fornyede rituximab-infusioner registreres det ved at ændre dosis fra 0 mg til f.eks. 1000 mg for de pågældende besøg.
6. Behandlingsforløbet afsluttes først, hvis patienten skifter til en anden biologisk behandling! Indtil da forbliver patienten i rituximab-forløbet.